

RAIVA EM HERBÍVOROS

Vale a pena
ser **LEGAL!!**



A Raiva em Herbívoros é uma doença fatal,
causada por vírus que afeta o sistema nervoso
central. Além de outros mamíferos, pode,
inclusive, afetar os seres humanos, sendo um
grave problema de saúde pública.



Sinais clínicos nos animais

- Isolamento do rebanho;
- Perda de apetite; hiperexcitabilidade;
- Salivação e dificuldade de engolir;
- Tremores e incoordenação motora (andar cambaleante);
- Diminuição da visão;
- Mugidos roucos;
- Fezes ressecadas;
- Incontinência urinária;
- Paralisia progressiva;
- Movimentos de pedalagem;
- Dificuldade respiratória;
- Asfixia e morte.

Evolução de 3 a 7 dias, podendo chegar a 10 dias.





ATENÇÃO!


O animal doente pode não apresentar todos esses sinais ao mesmo tempo.

Animais aparentemente engasgados, podem estar com raiva! Não tente desengasgá-lo! Procure um Médico Veterinário!



Como ocorre a transmissão:

O animal doente elimina o vírus pela saliva, transmitindo a doença quando morde, arranha ou lambe outro animal ou pessoas. O principal agente transmissor da raiva em herbívoros é o morcego hematófago (que se alimenta de sangue), da espécie *Desmodus rotundus*.



Prevenção

1. Vacinação dos animais: 1ª dose aos 3 meses de idade, reforço 30 dias após a 1ª dose;
2. Revacinar anualmente;
3. Adquirir vacinas somente de revendedores cadastrados no Serviço Veterinário Oficial;
4. Armazenar a vacina entre 2° a 8° C, não deixar exposta ao Sol;
5. Pasta vampiricida: aplicar nos animais, à tardinha, ao redor das feridas recentes provocadas pelo morcego



Em caso de suspeita de raiva, mordeduras nos animais por morcegos hematófagos ou de existência de abrigos em sua propriedade, notificar imediatamente ao Núcleo de Defesa Agropecuária ou no e-Sisbravet.



**Vale a pena
ser LEGAL!!**